

Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Administração

Concurso Público • Edital 001/SEA/2013

 <http://sea2013.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



29 de setembro



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



40 questões



## S7 Médico (Ortopedista)



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Periciais • Decreto 3338/10 (15 questões)

1. A incapacidade laborativa é a impossibilidade do desempenho do servidor de executar atividades específicas de seu cargo. Assim, em relação ao grau, a incapacidade que ainda permite o desempenho da atividade laboral, com restrições, porém sem risco de morte, é denominada de:

- a. ( ) Total.
- b. (X) Parcial.
- c. ( ) Temporária.
- d. ( ) Permanente.
- e. ( ) Invalidez.

2. Quando um servidor está impossibilitado de desempenhar toda e qualquer atividade laborativa, quanto a sua profissão sua incapacidade laborativa é dita:

- a. ( ) Específica.
- b. ( ) Inespecífica.
- c. ( ) Uniprofissional.
- d. ( ) Multiprofissional.
- e. (X) Omniprofissional.

3. No exame pericial para admissão do servidor é solicitada a apresentação de exames complementares. Para cargos que envolvam contato direto e permanente e/ou manuseio com agentes biológicos, materiais biológicos e pacientes são necessários:

- a. ( ) Audiometria, laringoscopia direta e teste de acuidade visual.
- b. ( ) Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax e ECG.
- c. ( ) Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, anti HIV1 e HIV2, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
- d. (X) Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax, ECG, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
- e. ( ) Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax, audiometria e teste de acuidade visual.

4. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** às doenças cardíacas que são impeditivas para a admissão do servidor.

- a. ( ) Bradicardia sinusal
- b. ( ) Extrassistolia isolada
- c. ( ) Síndrome de Wolf Parkinson White
- d. ( ) Bloqueio do ramo direito do feixe de Hiss
- e. (X) Cardiopatia congênita com alterações hemodinâmicas significativas

5. Considerando as doenças infectocontagiosas, assinale a alternativa em que os candidatos apresentam uma condição absoluta que é impeditiva para seu ingresso.

- a. ( ) Hanseníase
- b. ( ) Soropositivos para HIV
- c. (X) Hepatopatia crônica com insuficiência hepática
- d. ( ) Leishmaniose cutânea
- e. ( ) Tuberculose ativa

6. Analise o texto abaixo:

É assegurada à servidora efetiva uma licença para repouso por um período de ..... dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança ou ..... dias anteriores à data do parto, mediante perícia médica.

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) 180 ; 28
- b. ( ) 150 ; 30
- c. ( ) 120 ; 60
- d. ( ) 120 ; 28
- e. ( ) 90 ; 28

7. A Licença para Tratamento de Saúde de acordo com a Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, do IPREV, estabelece:

- a. ( ) Será concedida por até 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez, mediante manifestação de perícia médica oficial.
- b. ( ) Será concedida inicialmente até um período de 14 dias. Caso seja necessário um prazo maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
- c. ( ) Será concedida inicialmente até um período de 28 dias. Caso seja necessário um prazo maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
- d. (X) Será concedida por até 2 anos, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez, mediante manifestação de perícia médica oficial.
- e. ( ) Será concedida pelo prazo indicado no laudo ou atestado do médico assistente

---

8. Na concessão do benefício pericial de aposentadoria por invalidez, conforme a Lei Complementar nº 412 de 26 de junho de 2008, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** somente doenças incapacitantes, graves, contagiosas ou incuráveis que permitam tal condição:

- a. ( ) Tuberculose, hipoacusia e cardiopatia
- b. ( ) Hipoacusia, cegueira unilateral e cardiopatia.
- c. (X) Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e espondiloartrose anquilosante.
- d. ( ) Cegueira unilateral, doença de Paget e hepatopatia.
- e. ( ) Nefropatia, neoplasia maligna e soropositividade para HIV.

---

9. Os candidatos portadores de deficiência auditiva, com um perda do grau de audição de 25 a 40 decibéis, (db) são classificados como portadores de:

- a. (X) Surdez leve.
- b. ( ) Surdez severa.
- c. ( ) Surdez moderada.
- d. ( ) Surdez acentuada.
- e. ( ) Anacusia.

10. Em relação à aposentadoria por invalidez de servidores que apresentam evidência laboratorial de infecção pelo HIV, a concessão do benefício é feita em todas as condições abaixo, **exceto**:

- a. (X) Somente dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes.
- b. ( ) Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.
- c. ( ) Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos uma doença indicativa de AIDS (imunodeficiência).
- d. ( ) Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 350 células/mm<sup>3</sup>.
- e. ( ) Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 10 pontos numa escala de sinais, sintomas ou doenças.

---

11. A isenção da contribuição previdenciária é um benefício que somente pode ser concedido:

- a. ( ) Ao servidor ativo
- b. ( ) À servidora com Licença Gestante.
- c. (X) Ao servidor inativo aposentado por invalidez ou tempo de serviço.
- d. ( ) Ao servidor com licença para tratamento de saúde.
- e. ( ) Ao servidor com licença para tratamento de saúde de pessoa da família.

---

12. Para inclusão de dependentes junto ao IPREV/Pensão Previdenciária, de acordo com a Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, são considerados dependentes todos os abaixo, **exceto**:

- a. ( ) Filho menor de 21 anos.
- b. (X) Filha em qualquer idade.
- c. ( ) Filho maior, solteiro, inválido em caráter permanente de toda e qualquer atividade laboral e que viva sob a dependência econômica do segurado.
- d. ( ) Ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba pensão alimentícia.
- e. ( ) Cônjuge ou companheiro.

**Estado de Santa Catarina**

**13.** Conforme o Decreto nº 3749, de 28 de novembro de 2005, são definidos como “Segurados” do Plano Santa Catarina Saúde:

- a. ( ) Deputados Estaduais.
- b. ( ) Cartorários Extrajudiciais.
- c. ( ) Ocupantes de cargos comissionados.
- d. (X) Servidores ativos e inativos do Poder Executivo.
- e. ( ) Servidores públicos municipais à disposição sem ônus para o Estado

**14.** Em relação à legislação que trata do ingresso de candidatos que apresentam necessidades especiais, aquele que apresenta uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e desempenho de função ou atividade a ser exercida, é considerado como portador de uma:

- a. ( ) Limitação.
- b. ( ) Deficiência.
- c. ( ) Deficiência permanente.
- d. ( ) Impossibilidade.
- e. (X) Incapacidade.

**15.** Conforme a Lei nº 9899, de 21 de julho de 1995, nos concursos públicos para provimento dos cargos e empregos da Administração Direta e Indireta do Estado de Santa Catarina, será reservado aos portadores de deficiência, das vagas preestabelecidas, um percentual de:

- a. ( ) 1%.
- b. (X) 10%.
- c. ( ) 20%.
- d. ( ) 25%.
- e. ( ) 50%.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** Paciente que sofre fratura do acetábulo tem risco de lesar a *corona mortis*, o que poderá causar sangramento abundante e de difícil controle.

A *corona mortis* significa anastomose entre:

- a.  a Veia Obturatória e a Veia Femoral.
- b.  a Veia Ilíaca Interna e a Veia Femoral.
- c.  a Artéria Obturatória e a Artéria Femoral.
- d.  a Veia Ilíaca Interna e a Veia Ilíaca Externa.
- e.  a Artéria Ilíaca Interna e a Artéria Femoral.

**17.** A lesão do Nervo Cutâneo Femoral Lateral se manifesta como parestesia na face:

- a.  medial da coxa.
- b.  posterior da coxa.
- c.  ântero-lateral da coxa.
- d.  ântero-lateral do joelho.
- e.  ântero-medial do joelho.

**18.** A pesquisa de lesão da raiz de C7 relativa à motricidade é feita na avaliação:

- a.  do Músculo Deltoide.
- b.  da extensão do cotovelo.
- c.  dos Flexores do cotovelo.
- d.  dos Extensores do punho.
- e.  do Flexor profundo do 3 dedo.

**19.** Os defeitos de segmentação póstero-laterais produzem:

- a.  cifose.
- b.  escoliose.
- c.  cifoscoliose.
- d.  lordoescoliose.
- e.  lordose.

**20.** A diferenciação entre andar e correr acontece quando:

- a.  se altera a cinética do passo.
- b.  o duplo apoio se torna mais rápido.
- c.  o duplo balanço tem cinética mais lenta.
- d.  se substitui o período de duplo balanço pelo de duplo apoio.
- e.  se substitui o período de duplo apoio pelo de duplo balanço.

**21.** Escoliose com curva rígida, de grande valor angular e progressão rápida, tem como causa habitual o(a):

- a.  Discite.
- b.  Neurofibromatose.
- c.  Tumor intrarraquideo.
- d.  Tumor do corpo vertebral.
- e.  Tumor dos elementos posteriores da vértebra.

**22.** O Teste de Gerber produz:

- a.  dor na face posterior do ombro.
- b.  dor na face ântero-lateral do ombro.
- c.  instabilidade Acrômioclavicular.
- d.  instabilidade da articulação gleno-umeral.
- e.  o impacto entre a cabeça do Úmero e o processo Coracoide.

**23.** A deformidade congênita descrita por Kirner se caracteriza por:

- a.  angulação dorsal e radial da falange distal.
- b.  angulação volar e ulnar da falange distal.
- c.  angulação volar e radial da falange distal.
- d.  angulação dorsal e ulnar da falange distal.
- e.  angulação com rotação da falange distal.

## Estado de Santa Catarina

**24.** A Síndrome do Canal de Guyon descreve a compressão do nervo:

- a.  Ulnar no punho.
  - b.  Radial no punho.
  - c.  Ulnar no cotovelo.
  - d.  Radial no cotovelo.
  - e.  Mediano no punho.
- 

**25.** A contratura descrita como *Dupuytren* é doença da:

- a.  musculatura da região tênar.
  - b.  musculatura da região hipotênar.
  - c.  aponeurose da musculatura da região tênar.
  - d.  aponeurose palmar incluindo a retináculo palmar e digital.
  - e.  aponeurose da musculatura da região hipotênar.
- 

**26.** Na Paralisia Obstétrica de Erb-Duchenne, as raízes acometidas são as de:

- a.  C5 e C6.
  - b.  C5, C6 e C7.
  - c.  C6, C7 e C8.
  - d.  C7 e C8.
  - e.  C8 e T1.
- 

**27.** Ao se posicionar o membro inferior em abdução forçada no tratamento da Displasia do Desenvolvimento do Quadril pode acontecer:

- a.  luxação central da cabeça do Fêmur.
  - b.  necrose avascular da cabeça do Fêmur.
  - c.  subluxação anterior da cabeça do Fêmur.
  - d.  subluxação posterior da cabeça do Fêmur.
  - e.  subluxação inferior da cabeça do Fêmur.
- 

**28.** Para que o uso do suspensório de Pavlik seja correto ele deve bloquear a:

- a.  flexão ativa.
- b.  flexão e abdução.
- c.  adução e extensão.
- d.  extensão e abdução.
- e.  extensão e rotação interna.

**29.** O prognóstico da doença de Legg-Calvé-Perthes depende mais provavelmente do(a):

- a.  biótipo.
  - b.  peso do paciente.
  - c.  bilateralidade da doença.
  - d.  idade do início da doença.
  - e.  história familiar de Legg-Calvé-Perthes.
- 

**30.** O impacto acetabular deve-se ao contato anormal da junção cervicocefálica femoral contra

- a.  o rebordo acetabular anterior durante a flexão do quadril.
  - b.  o rebordo acetabular posterior durante a flexão do quadril.
  - c.  o rebordo acetabular anterior durante a extensão do quadril.
  - d.  o rebordo acetabular posterior durante a extensão do quadril.
  - e.  o rebordo acetabular lateral durante a flexão do quadril.
- 

**31.** A dor e o aumento de volume na Tuberosidade Anterior da Tíbia é denominada de:

- a.  Sinding-Larsen.
  - b.  Osteocondrite Dissecante.
  - c.  tendinite do tendão Patelar.
  - d.  Doença de Osgood-Schlatter.
  - e.  Doença de Köenig.
- 

**32.** O Sinal de Thompson positivo significa:

- a.  inflamação (tendinite) do tendão do Calcâneo.
- b.  inflamação (tendinite) do tendão Tibial Posterior.
- c.  impacto dos trigonum no aspecto posterior da Tíbia.
- d.  solução de continuidade do tendão Tibial Posterior.
- e.  solução de continuidade do tendão do Calcâneo.

**33.** O teste de Ober determina a contratura do músculo:

- a.  Psoas.
  - b.  Sartório.
  - c.  Glúteo Médio.
  - d.  Tensor da Fáschia Lata.
  - e.  Reto anterior da coxa.
- 

**34.** A causa mais comum de raquitismo carencial é a deficiência de:

- a.  Fosfato.
  - b.  Vitamina C.
  - c.  Vitamina D.
  - d.  Hidroxiapatita.
  - e.  Ácido Ascórbico.
- 

**35.** As fraturas diafisárias do Úmero têm indicação de cirurgia quando:

- a.  apresentam traço helicoidal.
  - b.  apresentam encurtamento de 1,5 cm.
  - c.  apresentam angulação anterior de 20 graus.
  - d.  apresentam angulação em varo de 25 graus.
  - e.  são oblíquas do terço distal ou segmentares.
- 

**36.** Em relação às fraturas diafisárias ou do colo dos ossos metatarsais, é **incorreto** afirmar:

- a.  os desvios no plano transversal são bem tolerados.
  - b.  têm indicação cirúrgica nas fraturas distais com angulação dorsal.
  - c.  as angulações laterais podem levar à compressão mecânica nos ossos adjacentes.
  - d.  no encurtamento maior de 3 a 4 mm, o tratamento cirúrgico é boa opção.
  - e.  na angulação plantar ou dorsal maior de 10 mm, o tratamento cirúrgico é boa opção.
- 

**37.** O teste de Watson serve para diagnosticar a instabilidade:

- a.  escafossemilunar.
  - b.  escafo-trapezoidal.
  - c.  Semilunar e do Capitato.
  - d.  do Escafoide e do Rádio.
  - e.  Rádio-ulnar distal.
- 

**38.** A Síndrome de Maffucci é descrita como:

- a.  Encondromatose Múltipla.
  - b.  Osteocondromatose Múltipla.
  - c.  associação da Encondromatose com hemangiomas múltiplos de tecido mole.
  - d.  Encondromatose de caráter unilateral.
  - e.  Condroma intraósseo.
- 

**39.** A reação periosteal descrita como lamelar é característica de:

- a.  cicatrização do tecido ósseo.
  - b.  lesão óssea agressiva.
  - c.  lesão óssea não agressiva.
  - d.  lesão óssea pseudo-tumoral.
  - e.  lesão reacional de partes moles.
- 

**40.** O biofilme que aparece na infecção pós-osteossíntese é descrito como:

- a.  soltura do material.
- b.  liberação de debris.
- c.  colônia de estafilococos.
- d.  reação ao material do implante (metalose).
- e.  comunidade de bactérias sésseis com glicocálix.



**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>