

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração

Concurso Público • Edital 001/SEA/2013

 <http://sea2013.fepese.org.br>

Caderno de Prova



29 de setembro



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



S8 Médico (Psiquiatra)



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Periciais • Decreto 3338/10 (15 questões)

1. A incapacidade laborativa é a impossibilidade do desempenho do servidor de executar atividades específicas de seu cargo. Assim, em relação ao grau, a incapacidade que ainda permite o desempenho da atividade laboral, com restrições, porém sem risco de morte, é denominada de:

- a. () Total.
- b. (X) Parcial.
- c. () Temporária.
- d. () Permanente.
- e. () Invalidez.

2. Quando um servidor está impossibilitado de desempenhar toda e qualquer atividade laborativa, quanto a sua profissão sua incapacidade laborativa é dita:

- a. () Específica.
- b. () Inespecífica.
- c. () Uniprofissional.
- d. () Multiprofissional.
- e. (X) Omniprofissional.

3. No exame pericial para admissão do servidor é solicitada a apresentação de exames complementares. Para cargos que envolvam contato direto e permanente e/ou manuseio com agentes biológicos, materiais biológicos e pacientes são necessários:

- a. () Audiometria, laringoscopia direta e teste de acuidade visual.
- b. () Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax e ECG.
- c. () Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, anti HIV1 e HIV2, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
- d. (X) Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax, ECG, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
- e. () Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, parcial de urina, radiografia de tórax, audiometria e teste de acuidade visual.

4. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** às doenças cardíacas que são impeditivas para a admissão do servidor.

- a. () Bradicardia sinusal
- b. () Extrassistolia isolada
- c. () Síndrome de Wolf Parkinson White
- d. () Bloqueio do ramo direito do feixe de Hiss
- e. (X) Cardiopatia congênita com alterações hemodinâmicas significativas

5. Considerando as doenças infectocontagiosas, assinale a alternativa em que os candidatos apresentam uma condição absoluta que é impeditiva para seu ingresso.

- a. () Hanseníase
- b. () Soropositivos para HIV
- c. (X) Hepatopatia crônica com insuficiência hepática
- d. () Leishmaniose cutânea
- e. () Tuberculose ativa

6. Analise o texto abaixo:

É assegurada à servidora efetiva uma licença para repouso por um período de dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança ou dias anteriores à data do parto, mediante perícia médica.

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) 180 ; 28
- b. () 150 ; 30
- c. () 120 ; 60
- d. () 120 ; 28
- e. () 90 ; 28

7. A Licença para Tratamento de Saúde de acordo com a Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, do IPREV, estabelece:

- a. () Será concedida por até 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez, mediante manifestação de perícia médica oficial.
- b. () Será concedida inicialmente até um período de 14 dias. Caso seja necessário um prazo maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
- c. () Será concedida inicialmente até um período de 28 dias. Caso seja necessário um prazo maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
- d. (X) Será concedida por até 2 anos, podendo ser prorrogada por igual período uma única vez, mediante manifestação de perícia médica oficial.
- e. () Será concedida pelo prazo indicado no laudo ou atestado do médico assistente

8. Na concessão do benefício pericial de aposentadoria por invalidez, conforme a Lei Complementar nº 412 de 26 de junho de 2008, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** somente doenças incapacitantes, graves, contagiosas ou incuráveis que permitam tal condição:

- a. () Tuberculose, hipoacusia e cardiopatia
- b. () Hipoacusia, cegueira unilateral e cardiopatia.
- c. (X) Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e espondiloartrose anquilosante.
- d. () Cegueira unilateral, doença de Paget e hepatopatia.
- e. () Nefropatia, neoplasia maligna e soropositividade para HIV.

9. Os candidatos portadores de deficiência auditiva, com um perda do grau de audição de 25 a 40 decibéis, (db) são classificados como portadores de:

- a. (X) Surdez leve.
- b. () Surdez severa.
- c. () Surdez moderada.
- d. () Surdez acentuada.
- e. () Anacusia.

10. Em relação à aposentadoria por invalidez de servidores que apresentam evidência laboratorial de infecção pelo HIV, a concessão do benefício é feita em todas as condições abaixo, **exceto**:

- a. (X) Somente dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes.
- b. () Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.
- c. () Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos uma doença indicativa de AIDS (imunodeficiência).
- d. () Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 350 células/mm³.
- e. () Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 10 pontos numa escala de sinais, sintomas ou doenças.

11. A isenção da contribuição previdenciária é um benefício que somente pode ser concedido:

- a. () Ao servidor ativo
- b. () À servidora com Licença Gestante.
- c. (X) Ao servidor inativo aposentado por invalidez ou tempo de serviço.
- d. () Ao servidor com licença para tratamento de saúde.
- e. () Ao servidor com licença para tratamento de saúde de pessoa da família.

12. Para inclusão de dependentes junto ao IPREV/Pensão Previdenciária, de acordo com a Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, são considerados dependentes todos os abaixo, **exceto**:

- a. () Filho menor de 21 anos.
- b. (X) Filha em qualquer idade.
- c. () Filho maior, solteiro, inválido em caráter permanente de toda e qualquer atividade laboral e que viva sob a dependência econômica do segurado.
- d. () Ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba pensão alimentícia.
- e. () Cônjuge ou companheiro.

Estado de Santa Catarina

13. Conforme o Decreto nº 3749, de 28 de novembro de 2005, são definidos como “Segurados” do Plano Santa Catarina Saúde:

- a. () Deputados Estaduais.
- b. () Cartorários Extrajudiciais.
- c. () Ocupantes de cargos comissionados.
- d. (X) Servidores ativos e inativos do Poder Executivo.
- e. () Servidores públicos municipais à disposição sem ônus para o Estado

14. Em relação à legislação que trata do ingresso de candidatos que apresentam necessidades especiais, aquele que apresenta uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e desempenho de função ou atividade a ser exercida, é considerado como portador de uma:

- a. () Limitação.
- b. () Deficiência.
- c. () Deficiência permanente.
- d. () Impossibilidade.
- e. (X) Incapacidade.

15. Conforme a Lei nº 9899, de 21 de julho de 1995, nos concursos públicos para provimento dos cargos e empregos da Administração Direta e Indireta do Estado de Santa Catarina, será reservado aos portadores de deficiência, das vagas preestabelecidas, um percentual de:

- a. () 1%.
- b. (X) 10%.
- c. () 20%.
- d. () 25%.
- e. () 50%.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o padrão de consumo de álcool considerado de risco para desenvolver problemas é caracterizado por consumo:

- a. () acima de 7 unidades de álcool por semana, para as mulheres.
- b. () acima de 10 unidades de álcool por semana, para os homens.
- c. (X) acima de 21 unidades de álcool por semana, para os homens.
- d. () diário de álcool, tanto para homens quanto para mulheres.
- e. () diário de álcool para os idosos com idade maior ou igual a 60 anos.

17. Caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas decorrentes do uso recente de uma substância, resultando em “alterações comportamentais e psicológicas mal adaptativas e clinicamente significativas”:

- a. (X) Intoxicação
- b. () Uso nocivo
- c. () Uso abusivo
- d. () Dependência
- e. () Síndrome de abstinência

18. Assinale a alternativa que contém a função cognitiva que sofre declínio no envelhecimento normal (sem demência):

- a. () Atenção seletiva
- b. () Inteligência Cristalizada
- c. () Memória terciária (remota)
- d. (X) Memória secundária (recente)
- e. () Memória Primária (ou imediata)

19. Analise o texto abaixo:

“A dependência (ao álcool) significa um relacionamento alterado entre a pessoa e a sua forma de beber... oferece razões para o beber que dominam as muitas razões precedentes para o beber (anteriores à sua existência)... tornando-se um comportamento que se auto mantém”

Edwards et al., 1999.

Assinale a alternativa que contém os parâmetros que caracterizam os quadros de dependência ao álcool:

- a. () Ocorrência de episódios de intoxicação; ocupar muito tempo ingerindo bebida alcoólica.
- b. () Uso diário de álcool; presença de sintomas de abstinência.
- c. () Ingesta acima de 30 unidades de álcool por semana; percepção ruim sobre os problemas causados pelo álcool.
- d. () História familiar de alcoolismo; ocorrência de tolerância ao álcool.
- e. (X) Ingerir bebida alcoólica muito mais do que pretendia; forte compulsão para beber.

20. Quais os fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas mais graves da Síndrome de Abstinência ao Álcool?

- a. () Idade jovem; convulsões prévias
- b. (X) Idade avançada; doença gastrointestinal
- c. () Idade jovem; história recente de uso de álcool
- d. () Comorbidade com doença clínica; duração curta do alcoolismo
- e. () Níveis sanguíneos baixos de gama glutamyl transferase; idade avançada

Estado de Santa Catarina

21. Assinale a alternativa que, segundo os critérios do DSM IV, contém a combinação de déficits necessários para o diagnóstico de demência.

- a. () Afasia, agnosia e déficit funcional
 - b. () Apraxia, agnosia e déficit funcional
 - c. () Afasia, déficit de memória e apraxia
 - d. () Déficit de memória, apraxia e agnosia
 - e. (X) Déficit de memória, apraxia e déficit funcional
-

22. Qual o exame indispensável para a confirmação do diagnóstico de demência?

- a. (X) Avaliação cognitiva
 - b. () Sorologia para sífilis
 - c. () Dosagem de vitamina B12
 - d. () Tomografia computadorizada de crânio
 - e. () Inventário de sintomas neuropsiquiátricos (NPI)
-

23. Assinale a alternativa que contém o padrão de início e evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer.

- a. () Início insidioso e evolução estável
 - b. () Início abrupto e evolução em escada
 - c. () Início abrupto e evolução progressiva
 - d. (X) Início insidioso e evolução progressiva
 - e. () Início insidioso e evolução em "escada"
-

24. Em exame de Ressonância Magnética, qual alteração é sugestiva de Doença de Alzheimer?

- a. () Assimetria de tálamo
 - b. (X) Atrofia de hipocampo
 - c. () Atrofia cerebral difusa
 - d. () Atrofia de corpo caloso
 - e. () Aumento dos ventrículos cerebrais
-

25. Segundo Schneider, é sintoma de primeira ordem dos quadros de esquizofrenia:

- a. () Perplexidade.
- b. () Mudanças do humor.
- c. (X) Roubo do pensamento.
- d. () Idéias delirantes súbitas.
- e. () Empobrecimento emocional.

26. É **correto** afirmar sobre a etiologia da esquizofrenia:

- a. (X) Trata-se de um transtorno neurodesenvolvimental.
 - b. () A concordância entre gêmeos dizigóticos é bastante superior à dos gêmeos homozigóticos.
 - c. () A influência da atitude da mãe tem um papel preponderante sobre os demais fatores.
 - d. () É secundária ao uso de substâncias psicoativas.
 - e. () Não há evidências sobre transmissão genética.
-

27. Em relação aos efeitos extrapiramidais dos antipsicóticos, é **correto** afirmar:

- a. () A acatisia responde bem aos antiparkinsonianos.
 - b. (X) A distonia aguda ocorre em geral nas primeiras horas ou dias após o início do uso.
 - c. () A síndrome parkinsoniana tem resposta insatisfatória ao uso de biperídeno.
 - d. () A sensação subjetiva de inquietação motora é denominada distonia.
 - e. () A discinesia tardia tem maior prevalência entre os jovens e naqueles com menor dose total de antipsicóticos.
-

28. Analise o texto abaixo:

"Padrão invasivo de déficits sociais e dificuldade para relacionamentos íntimos, distorções perceptivas, excentricidade, ideias de referência e crenças bizarras, pensamento bizarro, desconfiança, experiências perceptivas incomuns e afeto inadequado".

O texto descreve características de qual Transtorno de Personalidade?

- a. () Paranoide
- b. () Histriônico
- c. () Borderline
- d. () Esquizoide
- e. (X) Esquizotípico

29. Assinale a alternativa **correta** em relação à epidemiologia do Transtorno Bipolar.

- a. É mais prevalente entre os homens.
 - b. Inicia-se em geral na quarta década de vida.
 - c. Parentes de primeiro grau têm um risco maior de desenvolver a doença, até 18 vezes.
 - d. Homens têm maior probabilidade de episódios mistos e ciclagem rápida.
 - e. Episódio de mania nos idosos raramente se associa à presença de doenças orgânicas.
-

30. Qual a evolução mais esperada para o Transtorno Bipolar?

- a. Início do quadro com episódio de mania.
 - b. Episódio único ocorre em 50% dos casos.
 - c. A presença de sintomas psicóticos confere melhor prognóstico.
 - d. Aproximadamente 50% dos casos vão ter um segundo episódio dentro de 2 anos.
 - e. A ocorrência de intervalos maiores entre os episódios.
-

31. Segundo a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, é **correto** afirmar sobre o tratamento em regime de internação:

- a. É permitida a internação em instituições com características asilares, sem atenção integral.
- b. O término da internação voluntária se dá apenas por autorização do médico assistente.
- c. A internação compulsória se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro (por exemplo: o familiar).
- d. A internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico ou por orientação da direção da instituição.
- e. A internação involuntária deverá no prazo de 72 horas ser comunicada ao Ministério Público Federal.

32. O uso de lítio tem **menor** eficácia no Transtorno Bipolar em qual circunstância?

- a. Episódio misto
 - b. Adultos de meia idade
 - c. Primeiro episódio de mania
 - d. Evolução com episódios anuais
 - e. Transtorno Bipolar tipo I
-

33. É recomendável solicitar quais exames para monitorar o uso de lítio?

- a. ECG e eletrólitos
 - b. TSH e transaminases
 - c. Glicemia e transaminases
 - d. Gama glutamil transferase e glicemia
 - e. Transaminases e gama glutamil transferase
-

34. Os Transtornos de Personalidade se caracterizam por:

- a. Início na meia idade.
 - b. Apresentação egodistônica.
 - c. Preservação do afeto e da cognição.
 - d. Alta confiabilidade diagnóstica na adolescência.
 - e. Pior resposta a tratamento de comorbidades psiquiátricas.
-

35. Assinale a alternativa **correta** sobre a Eletroconvulsoterapia (ECT) para os quadros de depressão.

- a. É contraindicada nos idosos.
- b. Os efeitos sobre a memória são irreversíveis.
- c. A aplicação bilateral é mais efetiva do que a unilateral.
- d. A presença de sintomas psicóticos é preditiva de baixa resposta.
- e. A ECT real (com carga elétrica) tem eficácia comparável à ECT simulada (sem carga elétrica).

Estado de Santa Catarina

36. Qual a alteração comportamental mais prevalente entre os pacientes com epilepsia?

- a. () Mania
 - b. () Violência
 - c. () Depressão
 - d. (X) Alteração de personalidade
 - e. () Sintoma psicótico
-

37. Analise o texto abaixo:

“A psicoterapia cognitiva baseia-se no modelo cognitivo, que levanta a hipótese de que as emoções e comportamentos das pessoas são influenciados por sua percepção dos eventos.”

O entendimento das crenças é essencial para esta linha de psicoterapia. As crenças centrais são:

- a. () Flexíveis.
 - b. () Superficiais.
 - c. (X) Supergeneralizadas.
 - d. () Verdades Relativas.
 - e. () Específicas.
-

38. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

É **correto** afirmar sobre a Rede de Atenção Psicossocial:

- a. () O Hospital Psiquiátrico não é utilizado em hipótese alguma.
- b. (X) Tem a finalidade de criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental.
- c. () É formada exclusivamente pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- d. () As ações nas Unidades Básicas de Saúde se restringem à prevenção e promoção de saúde.
- e. () Os CAPS III oferecem atenção contínua, sendo referência como ponto de atenção de Urgência e Emergência.

39. O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, de 2006, prevê:

- a. () A ênfase nas atividades de prevenção ao uso indevido de drogas e atenção ao usuário, em detrimento das atividades de repressão.
 - b. () A adoção de abordagem psicossocial e o distanciamento de métodos biológicos nas ações de saúde.
 - c. () A adoção de uma estratégia única para as atividades de atenção à população de usuários de drogas.
 - d. (X) A definição de um projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde.
 - e. () A adoção de um projeto terapêutico orientado para a abstinência do uso de drogas e posterior reinserção social.
-

40. Sobre as ações de saúde mental na atenção primária:

- a. () Devem ser realizadas por profissionais especialistas de várias categorias.
- b. (X) Devem ter o apoio matricial do NASF sob a perspectiva de corresponsabilização.
- c. () O apoio do NASF é predominantemente orientado para o adequado encaminhamento para os serviços especializados (CAPS).
- d. () Devem se restringir ao acolhimento e posterior encaminhamento para o atendimento por profissionais do NASF, da área de saúde mental.
- e. () São orientadas basicamente para a prevenção e promoção de saúde.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>